

INSTRUCTIEKAART CORONA VIRUS COVID-19 VERSIE: 05/05/2020

PREVENTIEVE MAATREGELEN + PBM

Gevalsdefinitie (kan op elk moment wijzigen in functie van de beschikbare informatie!)

De meest actuele situatie is steeds te raadplegen via de website :

<https://epidemiology.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx>

Gevalsdefinitie 04/05/2020:

Een mogelijk geval van COVID-19 is elke persoon met
 - minstens één van de volgende hoofdsymptomen : hoest; dyspnoe; thoracale pijn; acute anosmie of dysgeusie zonder duidelijke oorzaak;
 OF

- minstens twee van de volgende symptomen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexia; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak;
 OF

- verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest...).

-Voortaan wordt er **bij iedere patiënt** (indien mogelijk) onmiddellijk een chirurgisch mondmasker geplaatst.

-Voortaan: bij iedere reanimatie worden de maatregelen genomen alsof het een mogelijk geval van COVID-19 is.

Overdracht

Via druppels respiratoir: via hoesten, niezen en spreken OF via rechtstreeks of onrechtstreeks contact via de handen en besmette oppervlakken

Preventie

Zeer strikte handhygiëne (wassen/ontsmetten) voor en na contact met patiënt of zijn omgeving.

iedere aanwezige laten hoesten/niezen in papieren zakdoek, gooi dit zakdoekje telkens weg. Indien geen zakdoek bij de hand, laat de persoon dan niezen/hoesten in zijn/haar elleboog.

Te gebruiken PBM's voor de HVA bij verdacht of bevestigd geval of bij vermelding van Code 19 door NC 112

-handschoenen (**Single gloved, dus NIET 2 paar boven mekaar aandoen**)
 -FFP2-masker,
 -steeds anti-spatbril, **faceshield** en wegwerpoverall,
 -er worden **geen** schoenovertrekken gebruikt wegens valgevaar
-draag een fluohesje klasse 2 bovenop je wegwerpoverall

Maatregelen bij de patiënt vooraleer de collega's van D1 de patiënt kunnen benaderen

-voor transport:
 - handhygiëne bij de patiënt met hydroalcoholische oplossing.
 - indien mogelijk de patiënt voorzien van handschoenen
 - steeds chirurgisch masker (indien zuurstoftoediening noodzakelijk: 4 l/min. via neusbril en chirurgisch masker)
 -bij de geïntubeerde patiënt of patiënt met larynxmasker wordt er steeds een beademingsfilter tussen de endotracheale tube of het larynxmasker en de beademingsballon geplaatst
 -MUG-begeleiding in functie van het oordeel van een MUG-arts.
 -wikkel de patiënt steeds in een laken of deken.

Te gebruiken PBM's D1 bij bv. horizontale evacuatie, bijvragen mankracht,...

Handschoenen en FFP2-masker enkel nodig bij het manipuleren van de patiënt, **zo weinig als mogelijk personeelsleden laten meehelpen aan deze taak.**

Maximaal aantal personen in ziekenwagen opgelegd door FOD Volksgezondheid

Geen passagiers, enkel 1 begeleider bij kinderen of een mantelzorgers indien medische noodzaak.
 Deze persoon zit vooraan, met chirurgisch mondmasker en na handhygiëne. Bij symptomen mag deze niet meegenomen worden!

Voor vertrek naar ziekenhuis

Verwittig NC112 met de melding vermoeden van COVID-19. Verwittig telefonisch de spoedgevallendienst, volg hun instructies.
 Bij aankomst de patiënt in de ambulance laten tot een verantwoordelijk verpleegkundige instructies geeft of komt kijken, **tenzij op voorhand andere instructies gegeven.**

NA TRANSPORT : zorg dat handalcohol en gele of rode vuilzak voor besmet materiaal in de directe omgeving aanwezig is.	
Afval materiaal éénmalig gebruik afkomstig verzorgen patiënt	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijder deze in de (gele) vuilzak voor besmet materiaal in het ziekenhuis in de daarvoor voorziene RMA-zone.
Linnen die in aanraking kwam met de patiënt	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijder deze in het ziekenhuis in de zakken voor besmet linnen in de daarvoor voorziene zone.
Brancard	PBM's nog niet verwijderen! <ul style="list-style-type: none"> - linnen van de brancard verwijderen in de desbetreffende zakken.
HVA	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijder alle PBM's buiten de ambulance, rechtstreeks in de gele of rode vuilzak voor besmet materiaal (uitgezonderd fluohesje, masker en bril). - Handschoenen uitdoen, handen ontsmetten, nieuw paar aandoen - Fluohesje uitdoen, in afgesloten plastic zak meenemen voor wassen - Faceshield en veiligheidsbril uitdoen en achteraf ontsmetten - Overall uitdoen - Masker uitdoen - Handschoenen uitdoen - Handen opnieuw ontsmetten
Voor vertrek naar standplaats	<ul style="list-style-type: none"> - Ontsmetting van de contactpunten van de bestuurderscabine, aangeraakt door de chauffeur tijdens transport naar ziekenhuis. - Ontsmet de bovenzijde van je schoenen met Umonium spray. - Verlaat zo snel mogelijk het ziekenhuis.
Reiniging en ontsmetting Sanitaire cel (gebeurt op standplaats, dus ambulance onbeschikbaar)	<p>Als de patiënt het masker gedurende het hele transport heeft opgehouden, is er geen speciale decontaminatie nodig. Desinfecteer in dit geval alleen de oppervlakken.</p> <p>Indien dit niet het geval was, reinig en ontsmet de sanitaire cel en de bestuurderscabine van de ambulance volgens de nieuwe instructiekaart DGH "Reiniging en ontsmetting ambulance na inzet (vermoedelijke Covid-19 patiënt" versie 30-3-2020.</p> <p>De Ambureg-tablet (en andere administratieve formaliteiten) wordt pas ingevuld nadat volledige reiniging en ontsmetting op standplaats is gebeurd.</p>
NAZORG / PERSOONLIJKE MAATREGELEN AMBULANCIER	
HVA	<ul style="list-style-type: none"> - Noteer duidelijk in de Ambureg fiche bij "Opmerkingen" dat je in contact kwam met een patiënt die (vermoedelijk) besmet was met het Corona virus. - Als de HVA symptomen van COVID-19 vertoont, moet hij/zij de huisarts consulteren, melden dat hij een zorgverlener is en vragen om een test te laten (zie rubriek Procedures => "Huisartsen" of "Ziekenhuizen" op de website https://epidemieo.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx).
Kledij HVA	<p>De ambulancierskledij wordt gereinigd volgens de normale hygiëne-afspraken. Deze kledij wordt steeds afzonderlijk gewassen in de wasmachine op een lang programma. Indien visuele vervuiling gebeurt dit met toevoeging van Umonium 38 Master 75 ml (in de trommel met doseerdop).</p> <p>Deze zelfde procedure wordt gevolgd voor het wassen van de fluohesjes. Echter moet er niet volgens de normale afspraken gewisseld worden van hesje maar moet dit bij elke rit gebeuren.</p>